DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT


SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

RHÔNE-ALPES

(ARBORICULTURE ET VITICULTURE)

130 F

ABONNEMENT ANNUEL: RÉGISSEUR RECETTES D.R.A.F.



165, rue Garibaldi -Bât. B- B.P. 3202 - 69401 LYON CEDEX 03

17 Février 1988 N° de série continue 162

Bulletin n° 2

UNE NOUVELLE SAISON DE TRAITEMENTS DEBUTE : VOS APPAREILS SONT-ILS REGLES ?

L'INDEX PHYTOSANITAIRE : UNE DOCUMENTATION COMPLETE SUR LES PRODUITS L'édition 1988 est parue. Vous pouvez la commander à : ACTA - 149, rue de Bercy - 75595 PARIS CEDEX 12 Prix: 85 Frs T.T.C. à la commande

P1 : COMMUNIQUE VIVACOOP : visite "Taille du pêcher"

ABRICOTIER : protection cuprique au débourrement

PECHER - Cloque : encore des bourgeons latéraux à protéger

Pucerons Verts : bientôt l'époque du traitement des fondatrices

: traitement ESCA : ne tardez pas VIGNE

: Gros Bourgeons ) CASSIS

Eliminez les rameaux atteints FRAMBOISIERS: Didymella

P3-4 : STADES PHENOLOGIQUES DES ARBRES FRUITIERS A NOYAUX

ARBRES FRUITIERS

COMMUNIQUE VIVACOOP

Taille du Pêcher

Suite à la réunion "Taille en vert" de cet été, VIVACOOP vous invite à une animation TAILLE DU PECHER :

> le MERCREDI 24 FEVRIER chez Monsieur Jean MANEVAL au Bois des Mattes à DONZERE :

- Formation et taille du double Y

- Taille classique et taille sur bois de 2 ans

Rendez-vous à 14 heures à VIVACOOP ou à 15 heures au Bois des Mattes.

ABRICOTIER

BACTERIOSE, CORYNEUM, MONILIA - Protection cuprique pour assainir le verger

1er traitement dès réception.

2ème traitement au stade D (pétales visibles).

Produit utilisable: bouillie dosée à 250 g de cuivre métal/hl.

P296

Une bonne prophylaxie est le complément indispensable de la lutte chimique :

- taille tardive avec désinfection fréquente des outils et protection des grosses plaies (rappel)
- éliminer et brûler les momies et rameaux porteurs de chancre

#### **PECHER**

CLOQUE - Protection encore nécessaire en situation de débourrement tardif

Observez le débourrement des <u>yeux à bois latéraux</u> : la protection est nécessaire tant que la pointe verte n'est pas bien dégagée.

PUCERON VERT (MYZUS) - Traitez les fondatrices au bon moment :

Les éclosions se poursuivent depuis le début du mois. Le choix de la date d'intervention doit prendre en compte 2 éléments :

- l'étalement dans le temps des éclosions des oeufs d'hiver

- la possibilité pour les fondatrices d'entrer dans les fleurs à partir du stade D (pétales visibles)

Seuil d'intervention : 7 % des rameaux habités.

Date : juste avant que les fondatrices ne puissent entrer dans les fleurs :

- vers la fin du stade C pour les variétés à fleurs campanulées (type Dixired),

- jusqu'au début du stade D pour les variétés à fleurs rosacées (type Springcrest).

Produits: lindane à 30 g ma/hl (formulation huileuse ou "col" ou lindane + huile blanche),

pyréthrinoïdes de synthèse; également efficaces contre les pucerons noirs (nb spéc.).

Remarque: sauf population importante, ce traitement est inutile sur les variétés qu'il
faudra protéger contre les thrips (traitement thrips-myzus à la fin de la chute des pétales).

#### PETITS FRUITS

CASSIS

GROS BOURGEONS

FRAMBOISIER

DIDYMELLA

Eliminez soigneusement et brûlez tous les rameaux atteints.

#### VIGNE

ESCA, EXCORIOSE - Ne tardez pas à réaliser le traitement à l'arsénite de soude De nombreuses parcelles devraient être traitées cette année contre l'ESCA.

Attention à la phytotoxicité de l'arsénite de soude : pas d'intervention :


- moins de 3 semaines avant le débourrement
- moins de 15 jours après la taille

VITICULTEURS, PROTEGEZ-VOUS LORS DU TRAITEMENT, PRENEZ GARDE A LIMITER LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT


### STADES PHENOLOGIQUES = STADES REPERES :

à chaque observation retener le stade le plus fréquent.

# pêcher




## cerisier



#### STADES PHENOLOGIQUES = STADES REPERES :

à chaque observation retener le stade le plus fréquent.

## abricotier



# prunier

